

Urzeitkrebs-Vorkommen in NÖ mit mehr als 2 Arten (von den 11 Standorten liegen 10 im hydrologischen Einflussbereich der March und 5 unmittelbar an der Langen Lüsse)

Dr. Erich Eder

Habitat	Lage	Arten (1994 – 2002)
"Blumengang" - Senke bei Engelhartstetten	March/Donau-Mündungsbereich 48°10'42" N 16°58'00" E	<i>L. apus</i> <i>T. cancriformis</i> <i>C. tetracerus</i> <i>E. ticinensis</i> <i>I. yeyetta</i> <i>L. dahalacensis</i> <i>L. lenticularis</i>
"Triops-Senke" (Lange Lüsse)	Untere March 48°14'24" N 16°56'25" E	<i>E. grubii</i> <i>L. apus</i> <i>T. cancriformis</i> <i>C. tetracerus</i> <i>I. yeyetta</i> <i>L. dahalacensis</i>
"August-Lacken" (Lange Lüsse)	Untere March 48°14'23" N 16°56'12" E	<i>T. cancriformis</i> <i>I. yeyetta</i> <i>L. lenticularis</i> <i>L. dahalacensis</i>
"T/L-Lacke" (Lange Lüsse)	Untere March 48°13'11" N 16°57'05" E	<i>L. apus</i> <i>T. cancriformis</i> <i>I. yeyetta</i> <i>L. lenticularis</i>
Feld südl. Markthof	Untere March 48°11'16" N 16°57'29" E	<i>B. schaefferi</i> <i>T. cancriformis</i> <i>I. yeyetta</i>
"Dammwiese" Marchegg	Untere March 48°16'48" N 16°54'18"	<i>L. apus</i> <i>T. cancriformis</i> <i>I. yeyetta</i>
Feld südl. Engelhartstetten	Untere March 48°10'26" N 16°53'27" E	<i>T. cancriformis</i> <i>I. yeyetta</i> <i>L. dahalacensis</i>
"Loimersdorfer Wiesen" bei Engelhartstetten	Untere March 48°10'47" N 16°57'10" E	<i>T. cancriformis</i> <i>I. yeyetta</i> <i>L. dahalacensis</i>
"Hoffnungslacke" (Lange Lüsse)	Untere March 48°13'05" N 16°57'18" E	<i>T. cancriformis</i> <i>I. yeyetta</i> <i>L. lenticularis</i>
"Kreuzlacke" südl. Markthof	Untere March 48°11'21" N 16°57'07" E	<i>B. schaefferi</i> <i>T. cancriformis</i> <i>I. yeyetta</i>
"Schlosslacke" (Lange Lüsse)	Untere March 48°13'05" N 16°57'18" E	<i>T. cancriformis</i> <i>I. yeyetta</i> <i>L. lenticularis</i>